

NORME DI PREPARAZIONE TC CON MEZZO DI CONTRASTO

Il giorno dell'esame il paziente deve:

1. presentarsi a digiuno da almeno 6 ore
2. portare gli esami preliminari richiesti
Creatinina
Glicemia
Esame Urine
Ricerca Proteina di Bence Jones
Elettrocardiogramma (solo nei pazienti cardiopatici).
3. il Modulo di richiesta compilato e firmato dal medico curante.
4. portare le FOTOCOPIE di eventuali esami precedenti inerenti la TC da eseguire (ecografie, RM, TC, radiografie e cartelle cliniche):

Per gli esami di:

TC ADDOME SUPERIORE
TC ADDOME INFERIORE
TC ADDOME COMPLETO
TC AORTA ADDOMINALE

oltre le precedenti indicazioni bisogna bere una bottiglia da 1,5 Lt di acqua naturale (non gassata, non effervescente) 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame

E' consentita una normale idratazione con acqua naturale. Non devono essere sospese eventualiterapie farmacologiche e, in particolare, quelle abituali per la "pressione alta" o il diabete.

Terapia con Metformina

- La sospensione del farmaco 48 ore prima e dopo l'esame deve avvenire esclusivamente previa valutazione e autorizzazione del proprio medico curante

IN CASO DI PAZIENTE ALLERGICO A FARMACI E/O STORIA DI ASMA IN ATTO, SEGUIRE LA PROFILASSI FARMACOLOGICA, NELL'ALLEGATO 1.

● **Il giorno prima dell'esame:**

h. 8.00 1 CPR PREDNISONONE (Deltacortene) 25 mg oppure 1 CPR METILPREDNISOLONE (Medrol) 16 mg

h. 8.00 1 CPR OMEPRAZOLO 20 mg

h. 20.00 1 CPR PREDNISONONE (Deltacortene) 25 mg oppure 1 CPR METILPREDNISOLONE (Medrol) 16 mg

h. 20.00 1 CPR CETIRIZINA 10 mg

● **Il giorno dell'esame:**

h. 8.00 1 CPR OMEPRAZOLO 20 mg

2(DUE) ORE PRIMA DELL'ESAME: 1 CPR PREDNISONONE (Deltacortene) 25 mg oppure 1 CPR METILPREDNISOLONE (Medrol) 16 mg

2(DUE) ORE PRIMA DELL'ESAME 1 CPR CETIRIZINA 10 mg