

NORME DI PREPARAZIONE RMN CON MEZZO DI CONTRASTO

Il giorno dell'esame il paziente deve:

1. presentarsi a digiuno da almeno 2 ore
2. portare gli esami preliminari richiesti:
Creatinina
3. portare le FOTOCOPIE di eventuali esami precedenti inerenti la TC da eseguire (ecografie, RM, TC, radiografie e cartelle cliniche):

IN CASO DI PAZIENTE ALLERGICO A FARMACI E/O STORIA DI ASMA IN ATTO, SEGUIRE LA PROFILASSI FARMACOLOGICA, NELL'ALLEGATO 1.

• Il giorno prima dell'esame:

h. 8.00 1 CPR PREDNISONONE (Deltacortene) 25 mg oppure 1 CPR METILPREDNISOLONE (Medrol) 16 mg

h. 8.00 1 CPR OMEPRAZOLO 20 mg

h. 20.00 1 CPR PREDNISONONE (Deltacortene) 25 mg oppure 1 CPR METILPREDNISOLONE (Medrol) 16 mg

h. 20.00 1 CPR CETIRIZINA 10 mg

• Il giorno dell'esame:

h. 8.00 1 CPR OMEPRAZOLO 20 mg

2(DUE) ORE PRIMA DELL'ESAME: 1 CPR PREDNISONONE (Deltacortene) 25 mg oppure 1 CPR METILPREDNISOLONE (Medrol) 16 mg

2(DUE) ORE PRIMA DELL'ESAME 1 CPR CETIRIZINA 10 mg